



**SINDICAT D'AGENTS DE POLICIA LOCAL**

## **VACUNACIÓN SEGUNDA DOSIS DEL PERSONAL ESENCIAL**

El 19 de mayo enviamos escrito vía registro al responsable del Departamento de Riesgos Laborales del ayuntamiento exigiéndole el cumplimiento del calendario de vacunación del COVID-19; recordamos que el plazo para administrar la segunda dosis para las personas vacunadas con la primera dosis de AstraZeneca era a primeros de mayo, ha pasado casi un mes y seguimos sin noticias.

Es triste que el Ayuntamiento no tenga claro todavía que tiene que hacer, hasta ahora se escudaba que no podían hacer nada hasta que el Ministerio o la Conselleria de Salut no indicaran directrices, pues bien, hace tiempo que las tomaron en referencia a la segunda dosis y nosotros en standby.

Los medios de comunicación han informado que, según un estudio hecho a unas 600 personas, el Ministerio de Salud recomienda poner la vacuna Pfizer como segunda dosis en lugar de la AstraZeneca, y en un comunicado de prensa posterior dice que quien lo desee, se podrá vacunar con AstraZeneca.

SAPOL ha tenido acceso a un comunicado del Dr. Oriol Mitjà, reconocido especialista en enfermedades infecciosas, donde recomienda utilizar la 2ª dosis de AstraZeneca. Y manifiesta que la evidencia que se tiene es que la combinación AstraZeneca y Pfizer puede ser mas eficaz, pero tiene mas efectos adversos leves, no teniendo datos sobre efectos adversos graves.

- La eficacia: Se midió en base a la cantidad de anticuerpos. La vacunación combinada con segunda dosis de Pfizer aumenta los anticuerpos neutralizantes 7 veces y con la segunda de AstraZeneca solo 3 veces, por lo que la combinación podría ser más eficaz.
- Los efectos adversos leves: La combinación de AstraZeneca y Pfizer indican un aumento en la frecuencia de reacciones adversas leves y moderadas. La combinación incrementa el riesgo de efectos adversos leves (dolor de cabeza, fiebre, dolores musculares) hasta un 40%.
- Los efectos adversos graves: Es muy seguro poner la segunda dosis de AstraZeneca a personas que no han padecido trombos en la primera dosis, en cambio no hay datos sobre la seguridad de la combinación con Pfizer. Alemania y Francia que utilizan la pauta combinada, aún no han publicado su experiencia sobre los efectos adversos graves.

Esperamos que esta información ayude al colectivo a tomar una decisión en relación con la segunda dosis de la vacuna, mientras la administración termine de pensárselo.

DIRECCION SAPOL

Barcelona, a 25 de mayo de 2021